QUELQUES NOUVELLES ESPÈCES ET UN NOUVEAU GENRE DE CURCULIONIDES DES ÎLES PHILIPPINES,

PAR

W. ROELOFS.

Mr. R. Oberthür a bien voulu me communiquer un certain nombre de Curculionides provenant des îles Philippines, parmi lesquels se trouvent quelques espèces et variétés nouvelles des genres *Eugithopus* et *Alcides*, et un genre nouveau, voisin de *Phacecorynes* Schhr. du même pays. J'en donne ici les descriptions.

I. EUGITHOPUS Chevr.

Les espèces de ce genre ont une forme fort homogène et une coloration distribuée d'une façon fort analogue, consistant en un fond sombre, sur lequel une couleur plus claire dessine des lignes longitudinales sur le prothorax et des lignes dans le même sens, avec d'autres transversales, sur les élytres.

Eugithopus ochreatus Eyd. et Soul., Var.

La collection Oberthür contient une variété de cette espèce, chez laquelle la couleur orangée est remplacée par un jaune d'ocre et

les taches brunes du type par des taches olivâtres. Le dessous est blanchâtre varié de taches de couleur olive. Les pattes grises.

L'individu unique (♂) provient de la collection Schmidt.

Eugithopus plagiatus n. sp.

15½ à 17 millim. (rostr. excl.).

Voisin de l'*E. ochreatus* et lui ressemblant pour la distribution des taches. Dessus d'un jaune-olivâtre avec des taches et des bandes d'un noir fuligineux, occupant une grande partie de la surface; dessous d'un blanc cendré avec des taches fuligineuses peu déterminées. Rostre aussi long que le prothorax, arqué un peu brusquement pas loin de sa base, plus gros et élargi de la base jusqu'à l'insertion des antennes vers son quart postérieur, cette partie garnie d'un enduit jaunâtre, le reste noir dénudé, très finement ponctué par dessus, très fortement ponctué et muni d'une rainure sur les côtés; dessous du rostre (♂) avec deux rangs de tubercules et deux rangées de poils s'effaçant vers le bout. Scape des antennes et l'extrémité des articles du funicule garnis d'enduit jaunâtre; massue à partie cornée plus grande et plus sécuriforme que chez *ochreatus*, sa partie tomenteuse plus courte et ne formant qu'une tranche étroite. Tête avec un point imprimé entre les yeux, son devant et le pourtour des yeux couverts d'enduit jaunâtre, le reste noir et ponctué.

Prothorax de la forme de celui de *ochreatus*, un peu plus long que large à sa base, ses côtés arrondis, graduellement rétrécis en avant, où il est courtement étranglé, sa base faiblement arrondie; il est couvert d'un enduit noir-fuligineux velouté, deux bandes d'un jaune-olivâtre se dessinent sur son disque, une autre bande presque blanche se trouve au dessus des hanches antérieures. Ecusson jaunâtre. Elytres environ de la moitié plus longues que larges à la base, pas plus larges que la base du prothorax, s'élargissant faiblement aux épaules et graduellement rétrécies en arrière, leur extrémité isolément arrondie; légèrement saillantes sur les côtés de la base, garnies de fines stries; inponctuées; plus de leur moitié

antérieure, sauf les côtés d'un jaune-fuligineux et entourant une grande tache noire sur chaque élytre; la couleur jaune continue au bout sur la suture et envoie une branche sur le cinquième intervalle en arrière.

Dessous obsolètement ponctué, d'un blanc cendré, lavé de noir fuligineux sur les côtés du métasternum et le milieu des segments de l'abdomen. Pygidium avec une ponctuation fine, peu serrée, jaunâtre.

Pattes blanchâtres, jambes avec de faibles rainures, ainsi que les cuisses garnies de poils bruns, peu abondants, sur leur tranche intérieure.

Collection R. Oberthür, deux individus mâles, marqués Ch. Semper, l'un Philippines, l'autre N. O. Luzon.

Eugithopus ornatus n. sp.

15 à 18 millim. (rostr. excl.).

De la forme générale de *E. elegans* et de *E. plagiatus*, mais un peu plus svelte, d'un noir-olive velouté, varié de blanc en dessous, la dernière couleur formant un dessin, composé de bandes étroites par dessus. Rostre comme chez les espèces voisines, finement ponctué, avec une rainure peu profonde sur les côtés de sa partie antérieure; sa partie basilaire, ainsi que les antennes, sauf la partie cornée de leur massue, garni d'un enduit blanc-jaunâtre. Tête avec une ligne très faible entre les yeux, finement ponctuée et garnie d'enduit jaunâtre par devant et autour des yeux. Prothorax plus étroit que chez l'espèce précédente, couvert d'une ponctuation obsolète, un peu plus marquée sur les côtés, d'un noir-olive velouté, avec une ligne très étroite au milieu et une bande assez large sur les côtés du disque; une ligne plus étroite se voit sur les côtés; elle part de la base, mais n'atteint pas le bord antérieur; une bande large et plus claire se trouve au dessus des hanches antérieures.

Ecusson blanc-jaunâtre. Elytres de la forme de celles de *E. plagiatus*, mais pas avancées sur les côtés de la base, comme chez

ce dernier; elles sont très finement striées, d'un noir-olivâtre velouté, leur base est étroitement bordée de blanc-jaunâtre et cette couleur s'étend un peu sur leurs côtés; elle couvre la suture et dessine un petit trait à la base du troisième intervalle; à la base du cinquième intervalle un autre trait se courbe au dehors, jusque sur le septième intervalle, et forme un arc rejoignant la suture un peu au delà du milieu; un trait de la même couleur se voit enfin sur l'extrémité du cinquième intervalle.

Dessous couvert d'une ponctuation fine, espacée; blanc, avec quelques taches noirâtres, dont une allant des hanches antérieures vers le bord antérieur, une autre sur le côté du métasternum, quatre sur les côtés des derniers segments de l'abdomen, la dernière occupant son extrémité, trois au milieu des segments intermédiaires.

Pygidium triangulaire, tronqué à l'extrémité, obsolètement ponctué, noirâtre, ses bords et la ligne médiane jaunâtres.

Pattes blanches; les cuisses finement ponctuées, lavées de noir; jambes avec des lignes de petites côtes; munies de cils excessivement courts.

Les deux individus de la collection R. Oberthür, que j'ai sous les yeux, ont un rostre entièrement lisse en dessous et me paraissent des femelles. L'un est marqué : Luzon, Ch. Semper; l'autre : Manille, ex coll. Mniszech.

Eugithopus elegans Roel., Var.

La collection Oberthür contient, avec un individu typique, une variété de petite taille (14 millim. rostr. excl.), de couleur vert-olive jaunâtre; la couleur claire qui dans la forme typique s'étend plus loin sur la suture, s'arrête ici derrière l'écusson; la tache sur la partie antérieure de l'élytre est faiblement indiquée, la bande transversale postérieure est étroite.

Avec l'indication : Lamar, Jan., 63, Philipp., Semper.

II. RHINOGRYPUS nov. genus.

Rostre et tête, pris ensemble, à peine aussi longs que le prothorax, le premier brusquement arqué vers son tiers postérieur, carré et gros dans sa partie postérieure jusqu'à l'insertion des antennes, où il est légèrement gibbeux, brusquement aminci de là jusqu'à l'extrémité. Scape des antennes dépassant le bord antérieur du prothorax, funicule aux deux premiers articles plus longs que les suivants, turbinés, le premier un peu plus long et plus gros que le second, les quatre suivants plus arrondis et graduellement plus grands, plus courts et transversaux; la massue comprimée, arrondie, sa partie spongieuse tranchante. Yeux grands, très rapprochés sur le front et en dessous. Prothorax aussi long que large, ses côtés graduellement rétrécis en avant, un peu sinués vers le milieu, sa base un peu sinué, son lobe médian aigu. Ecusson allongé, droit sur les côtés, pointu au bout. Elytres pas plus larges que le prothorax, de la moitié environ plus longues que larges, graduellement et faiblement rétrécies en arrière, leur extrémité arrondie. Pattes longues, peu robustes; hanches antérieures séparées; cuisses un peu comprimées, les postérieures courbées en dedans; jambes plus fortement comprimées, mucronées au bout; tarses longs, étroits, vileux en dessous, leur premier article plus long que les deux suivants, le quatrième plus long que les autres, les crochets robustes, distants à leur base. Pygidium petit, triangulaire. Les deux premiers segments de l'abdomen plus longs que les deux suivants; saillie intercoxale droite, très large; episternums du métathorax larges.

Le genre est voisin de *Phacecorynes* Schh., surtout par la forme peu différente de la massue antennaire; il s'en distingue abondamment par la forme du rostre, par la séparation des hanches antérieures, par la forme des pattes et par la construction des segments de l'abdomen. Le mâle diffère de la femelle par le métasternum déprimé au milieu.

Rhinogrypus velutinus n. sp.

15 à 18 millim. (rostr. excl.).

Rappelant la forme de *Phacecorynes Sommeri* Schh., mais moins resserré à la base du prothorax et des élytres, couvert d'un enduit noir-velouté, varié de rouge pourpre foncé; dessous noir et dénudé. Rostre obsolètement ponctué sauf vers le bout, couvert d'enduit de la base jusqu'à l'insertion des antennes, lisse sur le reste, avec une ligne imprimée allant du front jusqu'à l'insertion des antennes, et une dépression latérale aussi longue. Tête finement et irrégulièrement ponctuée. Prothorax couvert d'un enduit pourpre noirâtre, avec un dessin de lignes plus claires et d'une ponctuation ocelliforme, plus marquée sur les lignes; deux de ces dernières se voient au milieu du disque allant du devant, à la base, en s'écartant au milieu; une bande claire, paraissant sujette à se doubler, se voit sur les côtés. Ecusson noirâtre. Elytres aussi larges que la base du prothorax, avec des stries fines, celles des côtés plus sensiblement ponctuées; les intervalles des stries un peu arrondis; les élytres sont d'un noir velouté, lavé de pourpre et varié de rouge clair; cette dernière couleur s'étend un peu vers la base, elle forme une bande transversale allant de l'épaule plus en arrière vers la suture et dessinant vaguement un V; une seconde bande transversale se voit derrière le milieu et se dirige de la suture obliquement vers le côté en arrière, sur ces bandes se voient quelques lignes grises formées par de petites lignes sur les intervalles des stries. Dessous du corps noir, ainsi que les cuisses, couvert de points serrés, remplis d'enduit grisâtre; jambes rougeâtres, avec des rangs de petites côtes, garnis de cils très courts. Les hanches antérieures portent sur le côté postérieur de petits bouquets de poils courts brunâtres.

Trois individus de la collection de Mr. Oberthür, deux mâles et une femelle, indiqués de Luzon et de Mindanao, provenant de Semper et de la collection Mniszech; une femelle provenant de Wallis, dans la collection de Mr. Neervoort van de Poll.

III. ALCIDES Dalm.

Les nouvelles espèces, dont je donne ici la description, forment un groupe bien caractérisé dans le genre *Alcides*, par leur ressemblance de coloration avec les Pachyrhynchides, également des Philippines, consistant dans un fond métallique, sur lequel se détache un dessin de taches ou de lignes blanches. La seule espèce décrite qui en fait partie est *A. Semperi* Pasc. Toutes ont une grande analogie de forme avec elle, la différence existant surtout dans la forme plus ou moins parallèle. Comme toujours chez des espèces marquées de taches ou de lignes, elles varient fortement et la couleur du fond est même sujette à se modifier. Le dessin blanc est formé d'écailles, mais dont la forme est différente selon les espèces; les écailles sont ou longues et piliformes, ou plus courtes et rondes.

Mr. R. Oberthür a bien voulu me confier les belles et rares espèces de ce groupe, de sa riche collection; dans celle de Mr. Neervoort van de Poll et du Musée de Leide se trouvent respectivement une des espèces décrites ci-dessous.

Alcides Semperi Pasc., Var.

Dans la collection Oberthür se trouvent trois individus de cette espèce, dont un seul appartient au type, décrit par Mr. Pascoe. Tandis que celui-ci mesure environ 15 millim., les variétés n'en ont que 12 et 13 à 14. Le plus petit est de couleur verte au lieu de bleue, comme le type, le vert passe même au bronzé sur le prothorax, et au violet sur le rostre; les anneaux blancs sont situés comme ceux du type, sauf la tache sur le prothorax devant l'écusson, qui est presque effacée; celle de la base des élytres est réunie à celle qui suit sur le bord de l'élytre, tandis que cette dernière est difformée. Les anneaux suivants, près de la suture, sont normaux, mais les trois plus en arrière réunis de façon à former une bande transversale; les deux anneaux vers le bout sont

réunis et la petite tache sur l'extrémité est présente. Les taches en dessous ne diffèrent pas sensiblement de celles du type. Les pattes sont d'un vert métallique.

La seconde variété est plus aberrante; elle diffère du type en ce que les taches ne sont pas annuliformes mais pleines, leur bord étant un peu plus clair que l'intérieur; les trois taches derrière le milieu de l'élytre sont réunies sur leurs côtés; le dessous est pareil au type.

Au Musée de Leide se trouve un individu typique, de petite taille.

Alcides ocellatus n. sp.

13 à 15 millim. (rostr. excl.).

D'une forme analogue à celle de *Semperi* Pasc., mais d'ordinaire plus parallèle aux élytres, d'un rouge violacé métallique, à reflets bleus, et devenant très foncé sur la tête et le rostre, décoré de taches rondes d'un blanc bleuâtre, composées de poils. Rostre de la longueur de la tête et du prothorax, pris ensemble, assez robuste, ponctué sur les côtés de la base, avec une petite ligne imprimée au dessus à la hauteur de l'insertion des antennes. Tête lisse avec un point imprimé entre les yeux. Prothorax couvert d'une ponctuation très fine, peu serrée, avec une tache ronde près du bord antérieur, sur le côté du disque, une plus petite plus bas et une troisième à la base, un peu plus bas que l'épaule de l'élytre; une double tache au milieu de la base. Ecusson comme chez *Semperi*. Elytres plus parallèles que chez celui-ci, avec des stries de points fins, plus marquées. Sur chaque élytre se voient huit taches blanches plus ou moins rondes, dont une à la base près de l'épaule, une près de la suture, avant le milieu, une à la même hauteur, sur le côté, une quatrième plus en arrière au milieu du disque, la cinquième plus loin, contre la suture, la sixième au même niveau, contre le bord, les septième et huitième, l'une à côté de l'autre, sur l'extrémité de l'élytre. Sur le dessous les taches blanches se trouvent sur le milieu du prosternum, une entre les hanches in-

termédiaires, trois sur les côtés du métasternum, et des taches sur les côtés des segments de l'abdomen, à l'exception du second. Les pattes sont de la couleur du corps.

Unique dans la collection Oberthür, marqué Philippines, Ch. Semper. Un plus petit individu dans la collection Neervoort van de Poll.

La première collection renferme une variété de l'espèce, de taille plus petite (11 millim. sans le rostre) et de couleur fort différente; d'un bleu-verdâtre foncé, métallique sur le prothorax et les pattes, elle passe au noir sur les élytres, qui sont moins luisantes. Les taches sont d'un bleu-verdâtre pale; celles du côté du prothorax confluentes, les trois antérieures des élytres normales, celles du milieu confluentes et formant une ligne ondulée; les taches sur l'extrémité restent séparées. Les taches du dessous sont situées comme celles du type. L'individu est indiqué de Luzon, Semper.

Le Musée de Leide possède un individu de petite taille (10 millim.) d'un bleu d'acier, presque noir sur les pattes; les taches se trouvent exactement à la même place que dans ce qui me parait la forme typique de la collection Oberthür, mais elles sont réduites à des points blancs. L'individu porte l'indication: Parry, Ins. Philipp.

Alcides septemdecimnotatus n. sp.

14 millim. (rostr. excl.).

De la forme et de la taille de l'espèce précédente, d'un rouge carminé, vineux, médiocrement luisant, décoré de taches blanc-verdâtre. Rostre plus long que la tête et le prothorax pris ensemble, assez robuste, couvert d'une ponctuation longitudinalement confluente dans sa moitié basilaire [1]); la même partie est obsolètement carénée par dessus. La tête finement ponctuée, avec un point assez large entre les yeux. Prothorax finement et irrégulièrement ponctué,

1) L'individu de la collection Oberthür montre sur le côté de la base une impression triangulaire, qui manque à l'individu du Musée de Leide.

un peu plus fortement sur les côtés. Une tache, formée de petites écailles rondes, se trouve contre le rétrécissement antérieur sur le côté du disque, une autre au dessus de la hanche, une troisième à la base sur le côté du disque. Ecusson ponctiforme, assez saillant. Elytres transversalement déprimées derrière leur base, qui est relevée; finement ponctué-striées; des taches blanches se trouvent 1°. une contre l'écusson, partagée en deux par la suture; 2°. une, plus grande, plus en arrière près de la suture; 3°. une tout près de celle-ci, mais un peu plus en arrière, sur le côté de l'élytre; deux taches pareilles et situées relativement l'une de l'autre comme les précédentes, se trouvent plus en arrière, et sur l'extrémité de l'élytre se voit une tache en forme de V. Dessous de la couleur du dessus, assez densément garni d'écailles blanches. Cuisses fortement en massue, ponctué-striolées, surtout à la base et vers le bout; jambes avec une rainure obsolète à l'extérieur, ponctué-striolées.

Unique dans la collection Oberthür, marqué: Camiguin de Luzon, Philippines, Ch. Semper.

Un seul exemplaire se trouve au Musée de Leide, différant de celui de la collection Oberthür par l'absence de la tache près de la suture, sur la partie antérieure de l'élytre, et en ce que les deux taches plus en arrière sont confluentes. Il provient de Parry.

Alcides decoratus n. sp.

10 à 12 millim. (rostr. excl.).

Plus parallèle que les autres espèces voisines, d'un rouge cuivreux luisant, passant parfois au verdâtre, décoré de taches et de bandes, composées de petites écailles rondes blanc-verdâtres. Rostre environ de la longueur de la tête et du prothorax pris ensemble, finement ponctué jusque vers la moitié postérieure, sa partie antérieure noirâtre. La tête finement ponctué avec une impression forte entre les yeux. Prothorax convexe, couvert d'une ponctuation fine et serrée, avec une tache allongée sur le côté en avant contre le rétrécissement antérieur, une petite tache au dessus de la hanche antérieure et une troisième à côté de la base. Ecusson ponctiforme,

fort déprimé. Elytres fortement élevées à leur base et fortement, transversalement, déprimées derrière elle, parallèles sur les côtés; leurs stries finement ponctuées et assez marquées. Une linéole blanche part à côté de l'écusson et se courbe de façon à former avec une ligne sur le côté un arc de cercle. Une bande transversale se voit derrière le milieu de l'élytre; elle se courbe sur le côté en arrière, de façon à rejoindre un trait qui se redresse vers le troisième intervalle, et forme une espèce de V sur l'extrémité. Des écailles blanches couvrent une assez grande partie du dessous, mais laissent parfois de plus grands espaces dénudés. Cuisses ponctué-striées à leur base et vers le bout; jambes avec une rainure obsolète en dehors, les antérieures faiblement élargies sur la tranche intérieure.

La collection Oberthür renferme deux individus de cette espèce, l'un d'un rouge cuivreux, l'autre verdâtre, presque bleu sur le prothorax. Le premier est marqué Philippines, Ch. Semper, l'autre Luzon, Ch. Semper.

Alcides rutilans n. sp.

12 à 13 millim. (rostr. excl.).

D'une forme moins parallèle que l'espèce précédente, d'une couleur rouge-laque à reflets verts, passant parfois au verdâtre métallique, très brillant, décoré de taches et de bandes blanches, composées d'écailles piliformes. Rostre assez court, ponctué à la base, surtout sur les côtés. Tête presque lisse, avec un point imprimé entre les yeux. Prothorax finement ponctué, avec une tache antérieure contre le rétrécissement, qui s'étend parfois davantage sur les côtés, et une autre sur le côté de la base; une troisième plus petite devant l'écusson. Ecusson déprimé, ponctiforme. Elytres finement striées-ponctuées, leur base médiocrement relevée, avec une tache blanche, un peu déprimée, parfois transversale, à leur base, une bande blanche transversale avant et une autre analogue derrière leur milieu; sur l'extrémité de l'élytre deux taches forment un V, plus ou moins

arrêté, et sur la pointe extrême de l'élytre encore une petite tache. Le dessous a des taches blanches sur le milieu du prosternum, du mésosternum, sur les côtés du métasternum, le premier segment de l'abdomen et les côtés des troisième et quatrième segments. Cuisses ponctuées à leur base; jambes avec une rainure obsolète au dehors, les antérieures avec une dent bien prononcée en dedans.

Deux individus dans la collection Oberthür. Chez l'un d'eux la bande blanche derrière le milieu de l'élytre se resout en trois taches. Avec l'indication: Philippines, Semper, l'un avec le nom ajouté Palope.

Alcides smaragdinus n. sp.

14 millim. (rostr. excl.).

Se rapprochant pour la forme de *A. Semperi* Pasc. et se distinguant de cette espèce et des autres voisines par ses élytres sans taches, sauf une très petite sur l'extrémité, et par la forme des pattes. D'un vert-bleuâtre, luisant. Rostre assez robuste, aussi long que la tête et le prothorax pris ensemble, un peu caréné dans la moitié postérieure, qui est assez fortement ponctuée et un peu aplatie par dessus, obsolètement carénée sur les côtés, et offrant par devant une carène double, ponctuée; une petite ligne imprimée se distingue vers l'insertion des antennes. Antennes noir-violacées, massue grisâtre. Tête vaguement ponctuée, avec un point enfoncé entre les yeux. Prothorax assez fortement ponctué, avec une tache blanche, apparente, vers le rétrécissement antérieur, sur le côté du disque, et une autre plus bas sur le côté; base du prothorax étroitement bordé de blanc sur les côtés et offrant une petite tache devant l'écusson. Ecusson très petit, ponctiforme. Elytres pas plus larges que le prothorax à leur base, de la forme ovale-allongée de celles de *A. Semperi*; leur base peu relevée et faiblement transversalement impressionée, avec des lignes de points formant des stries très fines. Pattes longues et peu fortes, surtout les antérieures; les dernières un peu rugueuses

à la base et très fortement dentées. Dessous des cuisses antérieures, milieu du posternum, côtés du métasternum et des segments abdominaux, à l'exception du deuxième, avec des poils blancs.

Un seul individu dans la collection Oberthür, marqué: Philippines, Semper, Pulolatu (?).